

▲ HAZ CLIC EN LAS PESTAÑAS DE ARRIBA PARA CONOCER MÁS ▲

RINVOQ es un inhibidor de las JAK indicado para adultos con espondilitis anquilosante (EA) en quienes los bloqueadores del TNF no funcionaron bien.



**REBELATE
CONTRA**

**LA ESPONDILITIS
ANQUILOSANTE (EA)**

Si aún tienes síntomas de EA después de un bloqueador del TNF como HUMIRA® o ENBREL®, RINVOQ es diferente y puede ser de ayuda.

USO

RINVOQ es un medicamento recetado usado para tratar a adultos con espondilitis anquilosante activa cuando 1 o más medicamentos, conocidos como bloqueadores del factor de necrosis tumoral (TNF, por sus siglas en inglés), se han usado y no han funcionado bien o no pudieron tolerarse. No se conoce si RINVOQ es seguro y eficaz en niños con espondilitis anquilosante.

CONSIDERACIONES DE SEGURIDAD

RINVOQ puede causar efectos secundarios graves, entre ellos:

- **Infecciones graves.** RINVOQ puede reducir la capacidad para combatir infecciones. Han ocurrido infecciones graves, en ocasiones mortales, incluidas tuberculosis (TB) e infecciones causadas por bacterias, hongos o virus.
- **Aumento en el riesgo de muerte en personas mayores de 50 años con al menos 1 factor de riesgo de enfermedad cardíaca.**
- **Cáncer y problemas del sistema inmunitario.** Aumento del riesgo de algunos cánceres, incluidos linfoma y cáncer de la piel. Las personas que actualmente fuman o han fumado en el pasado corren un riesgo mayor de linfoma y cáncer de pulmón.
- **Aumento en el riesgo de eventos cardiovasculares importantes, como ataque cardíaco, derrame cerebral o muerte, en personas mayores de 50 años con al menos 1 factor de riesgo de enfermedad cardíaca, en especial si actualmente fuman o han fumado en el pasado.**
- **Coágulos sanguíneos,** algunos mortales, en las venas de las piernas o los pulmones y las arterias. Esto ha ocurrido con más frecuencia en personas mayores de 50 años con al menos 1 factor de riesgo de enfermedad cardíaca.
- **Reacciones alérgicas graves. No lo tome si ha presentado alergia a RINVOQ o a sus ingredientes.**
- **Desgarres en el estómago o los intestinos; cambios en resultados de pruebas de laboratorio específicas.**

Consulte más Información importante de seguridad en las páginas 7 y 8. Consulte la Información de prescripción completa, incluida la [Guía del medicamento](http://www.rxabbvie.com/pdf/rinvoq_pi_spa.pdf), en www.rxabbvie.com/pdf/rinvoq_pi_spa.pdf y consulte con su médico.

ENBREL® (etanercept) es una marca registrada de Immunex Corporation en EE. UU.

En un estudio clínico, RINVOQ ayudó a lograr un

ALIVIO POTENTE

de la rigidez y el dolor de espalda de la EA.



RINVOQ ayudó a muchas personas a aliviar considerablemente sus síntomas de EA en **14 semanas** en comparación con el placebo (44.5% frente al 18.2%); algunas de ellas notaron mejoras **en tan solo 4 semanas**.



RINVOQ contribuyó a reducir la actividad general de la enfermedad EA, que se midió por medio de un cuestionario sobre distintos síntomas, a saber: **dolores articulares e hinchazón, entesitis** (dolor e hinchazón en áreas como los talones y los codos) **y rigidez matutina**.



RINVOQ puede ofrecer a las personas noches con menos dolor de espalda y mejores días por delante.



Los pacientes con EA pueden disfrutar de una mejor calidad de vida.



RINVOQ podría reducir el cansancio en la EA.



[Ver más resultados con RINVOQ >](#)

CONSIDERACIONES DE SEGURIDAD

RINVOQ puede causar efectos secundarios graves, entre ellos:

- **Infecciones graves.** RINVOQ puede reducir la capacidad para combatir infecciones. Han ocurrido infecciones graves, en ocasiones mortales, incluidas tuberculosis (TB) e infecciones causadas por bacterias, hongos o virus.
- **Aumento en el riesgo de muerte en personas mayores de 50 años con al menos 1 factor de riesgo de enfermedad cardíaca.**
- **Cáncer y problemas del sistema inmunitario.** Aumento del riesgo de algunos cánceres, incluidos linfoma y cáncer de la piel. Las personas que actualmente fuman o han fumado en el pasado corren un riesgo mayor de linfoma y cáncer de pulmón.
- **Aumento en el riesgo de eventos cardiovasculares importantes, como ataque cardíaco, derrame cerebral o muerte, en personas mayores de 50 años con al menos 1 factor de riesgo de enfermedad cardíaca, en especial si actualmente fuman o han fumado en el pasado.**
- **Coágulos sanguíneos,** algunos mortales, en las venas de las piernas o los pulmones y las arterias. Esto ha ocurrido con más frecuencia en personas mayores de 50 años con al menos 1 factor de riesgo de enfermedad cardíaca.
- **Reacciones alérgicas graves. No lo tome si ha presentado alergia a RINVOQ o a sus ingredientes.**
- **Desgarres en el estómago o los intestinos; cambios en resultados de pruebas de laboratorio específicas.**

Consulte más Información importante de seguridad en las páginas 7 y 8. Consulte la **Información de prescripción** completa, incluida la **Guía del medicamento**, en www.rxabbvie.com/pdf/rinvoq_pi_spa.pdf y consulte con su médico.



Para adultos con espondilitis anquilosante (EA) activa en quienes los bloqueadores del TNF no funcionaron bien.

Ponte en movimiento. Más **RESULTADOS** con RINVOQ

RINVOQ ayudó a aumentar el funcionamiento físico y así facilitar las actividades cotidianas. Las personas en tratamiento con RINVOQ completaron un cuestionario, en el que se les preguntó sobre su capacidad para hacer actividades, por ejemplo:



Inclinarse desde la cintura para recoger objetos del piso.



Subir 12 a 15 escalones sin tomarse de la baranda.



Hacer actividades durante todo el día, en casa o en el trabajo.



Levantarse de una silla sin ayuda.



Habla con tu reumatólogo para saber si el alivio que ofrece RINVOQ podría ser adecuado para ti.

CONSIDERACIONES DE SEGURIDAD

RINVOQ puede causar efectos secundarios graves, entre ellos:

- **Infecciones graves.** RINVOQ puede reducir la capacidad para combatir infecciones. Han ocurrido infecciones graves, en ocasiones mortales, incluidas tuberculosis (TB) e infecciones causadas por bacterias, hongos o virus.
- **Aumento en el riesgo de muerte en personas mayores de 50 años con al menos 1 factor de riesgo de enfermedad cardíaca.**
- **Cáncer y problemas del sistema inmunitario.** Aumento del riesgo de algunos cánceres, incluidos linfoma y cáncer de la piel. Las personas que actualmente fuman o han fumado en el pasado corren un riesgo mayor de linfoma y cáncer de pulmón.
- **Aumento en el riesgo de eventos cardiovasculares importantes, como ataque cardíaco, derrame cerebral o muerte, en personas mayores de 50 años con al menos 1 factor de riesgo de enfermedad cardíaca, en especial si actualmente fuman o han fumado en el pasado.**
- **Coágulos sanguíneos,** algunos mortales, en las venas de las piernas o los pulmones y las arterias. Esto ha ocurrido con más frecuencia en personas mayores de 50 años con al menos 1 factor de riesgo de enfermedad cardíaca.
- **Reacciones alérgicas graves. No lo tome si ha presentado alergia a RINVOQ o a sus ingredientes.**
- **Desgarres en el estómago o los intestinos; cambios en resultados de pruebas de laboratorio específicas.**

Consulte más Información importante de seguridad en las páginas 7 y 8. Consulte la **Información de prescripción** completa, incluida la **Guía del medicamento**, en www.rxabbvie.com/pdf/rinvoq_pi_spa.pdf y consulte con su médico.



Para adultos con espondilitis anquilosante (EA) activa en quienes los bloqueadores del TNF no funcionaron bien.

RINVOQ: UNA PASTILLA AL DÍA

- Toma RINVOQ una vez al día, todos los días.
- Puedes tomar RINVOQ con o sin alimentos.
 - Evite consumir alimentos o bebidas que contengan toronja (pomelo).
 - No partas, tritures ni mastiques la pastilla.
- Entre tú y tu médico determinarán el plan de tratamiento óptimo.

Si notas que hay residuos del medicamento (un comprimido entero o en fragmentos) en las heces, llama a tu proveedor de salud.

Frasco fácil de abrir

RINVOQ fue galardonado con el premio de reconocimiento a la facilidad de uso de la Arthritis Foundation, por la innovadora tapa del frasco, su perfil ancho y su empuñadura para abrir fácilmente.



Ve cómo se abre el frasco en [RINVOQ.com/as-bottle](https://www.rinvoq.com/as-bottle)

RINVOQ EN ACCIÓN

En la EA, el sistema inmunitario está hiperactivo y ataca la columna vertebral.

RINVOQ es un inhibidor de las JAK (cinasa jano) que **REGULA** el sistema inmunitario hiperactivo para **AYUDAR A DETENER** el ataque.

RINVOQ actúa en el interior de las células para bloquear determinadas señales que al parecer causan inflamación.

Obtén más información sobre la ciencia que respalda a RINVOQ y su modo de acción en [RINVOQ.com/as-science](https://www.rinvoq.com/as-science)

CONSIDERACIONES DE SEGURIDAD

RINVOQ puede causar efectos secundarios graves, entre ellos:

- **Infecciones graves.** RINVOQ puede reducir la capacidad para combatir infecciones. Han ocurrido infecciones graves, en ocasiones mortales, incluidas tuberculosis (TB) e infecciones causadas por bacterias, hongos o virus.
- **Aumento en el riesgo de muerte en personas mayores de 50 años con al menos 1 factor de riesgo de enfermedad cardíaca.**
- **Cáncer y problemas del sistema inmunitario.** Aumento del riesgo de algunos cánceres, incluidos linfoma y cáncer de la piel. Las personas que actualmente fuman o han fumado en el pasado corren un riesgo mayor de linfoma y cáncer de pulmón.
- **Aumento en el riesgo de eventos cardiovasculares importantes, como ataque cardíaco, derrame cerebral o muerte, en personas mayores de 50 años con al menos 1 factor de riesgo de enfermedad cardíaca, en especial si actualmente fuman o han fumado en el pasado.**
- **Coágulos sanguíneos,** algunos mortales, en las venas de las piernas o los pulmones y las arterias. Esto ha ocurrido con más frecuencia en personas mayores de 50 años con al menos 1 factor de riesgo de enfermedad cardíaca.
- **Reacciones alérgicas graves. No lo tome si ha presentado alergia a RINVOQ o a sus ingredientes.**
- **Desgarres en el estómago o los intestinos; cambios en resultados de pruebas de laboratorio específicas.**

Hay algunos medicamentos que no se deben usar al mismo tiempo que RINVOQ. **Informe a su proveedor de atención médica de todos los medicamentos que use,** incluidos los de venta con y sin receta, las vitaminas y los suplementos a base de hierbas. RINVOQ y otros medicamentos pueden reaccionar entre sí y dar lugar a efectos secundarios.

Consulte más Información importante de seguridad en las páginas 7 y 8. Consulte la [Información de prescripción](#) completa, incluida la [Guía del medicamento](#), en www.rxabbvie.com/pdf/rinvoq_pi_spa.pdf y consulte con su médico.



Para adultos con espondilitis anquilosante (EA) activa en quienes los bloqueadores del TNF no funcionaron bien.

Sé franco con tu REUMATÓLOGO

Si tu plan actual de tratamiento no te está dando los resultados que quieres, habla abiertamente con tu reumatólogo para explorar tus opciones terapéuticas.

Tu reumatólogo deberá:



Preguntarte sobre el efecto de tus síntomas en tu vida diaria



Colaborar contigo para elaborar un plan de tratamiento y establecer metas



Dar seguimiento a tu evolución y las mejoras de tus síntomas



Hacer ajustes adecuados a tu plan de tratamiento si no estás alcanzando tus metas



No te conformes con los síntomas de la EA cuando puedes

DEFENDERTE

Visita [RINVOQ.com/as-checklist](https://rinvoq.com/as-checklist) para obtener una Lista de verificación para citas para saber cuáles son los temas que puedes compartir con tu reumatólogo.

Busca un reumatólogo cerca de tu domicilio. Visita [RINVOQ.com/as-rheum](https://rinvoq.com/as-rheum)

Últimas noticias sobre RINVOQ para la EA: Inscríbete en [RINVOQ.com/as-signup](https://rinvoq.com/as-signup)

CONSIDERACIONES DE SEGURIDAD

RINVOQ puede causar efectos secundarios graves, entre ellos:

- **Infecciones graves.** RINVOQ puede reducir la capacidad para combatir infecciones. Han ocurrido infecciones graves, en ocasiones mortales, incluidas tuberculosis (TB) e infecciones causadas por bacterias, hongos o virus.
- **Aumento en el riesgo de muerte en personas mayores de 50 años con al menos 1 factor de riesgo de enfermedad cardíaca.**
- **Cáncer y problemas del sistema inmunitario.** Aumento del riesgo de algunos cánceres, incluidos linfoma y cáncer de la piel. Las personas que actualmente fuman o han fumado en el pasado corren un riesgo mayor de linfoma y cáncer de pulmón.
- **Aumento en el riesgo de eventos cardiovasculares importantes, como ataque cardíaco, derrame cerebral o muerte, en personas mayores de 50 años con al menos 1 factor de riesgo de enfermedad cardíaca, en especial si actualmente fuman o han fumado en el pasado.**
- **Coágulos sanguíneos,** algunos mortales, en las venas de las piernas o los pulmones y las arterias. Esto ha ocurrido con más frecuencia en personas mayores de 50 años con al menos 1 factor de riesgo de enfermedad cardíaca.
- **Reacciones alérgicas graves. No lo tome si ha presentado alergia a RINVOQ o a sus ingredientes.**
- **Desgarres en el estómago o los intestinos; cambios en resultados de pruebas de laboratorio específicas.**

Consulte más Información importante de seguridad en las páginas 7 y 8. Consulte la [Información de prescripción](#) completa, incluida la [Guía del medicamento](#), en www.rxabbvie.com/pdf/rinvoq_pi_spa.pdf y consulte con su médico.



Para adultos con espondilitis anquilosante (EA) activa en quienes los bloqueadores del TNF no funcionaron bien.

Estamos

CONTIGO

Una vez que tú y tu médico decidan hacerle frente a la EA con RINVOQ, tendrás acceso a **AbbVie Contigo**, una experiencia excepcional que te brinda los recursos que necesitas cuando los necesitas. Ya sea para guiarte a incorporar RINVOQ a tu vida o bien, con recursos para mantenerte encaminado en el plan de tratamiento indicado, tu dedicado **Especialista de Cuidado de AbbVie Contigo*** está disponible para ayudarte en cada paso del camino.

Independientemente de la cobertura de tu seguro médico, tu Especialista de Cuidado puede ponerte en contacto con un Especialista de Apoyo para el Acceso, que te ayuda a comprender de qué se trata tu cobertura e identificar posibles maneras de ahorrar en tus recetas.



PARA INSCRIBIRTE, PUEDES:



Hacer los trámites con el consultorio de tu médico



Llamar al **1.855.CONTIGO**
(1.855.266.8446)

Visita www.abbvie.com/privacy.html para ver información sobre las prácticas de privacidad de AbbVie y para los términos y condiciones.



Visita RINVOQSavingsCard.com



Con la tarjeta de **Ahorros Contigo**, podrías pagar tan poco como **\$5/mes†**.



Esta no es una tarjeta física. Menciónale a tu farmacia especializada la tarjeta de Ahorros Contigo para RINVOQ para que el personal de la farmacia pueda activar este beneficio de forma electrónica en línea a tu nombre.

*Los Especialistas de Cuidado son proporcionados por AbbVie y no trabajan bajo la dirección de su profesional del cuidado de la salud (PCS) ni ofrecen consejo médico. Están adiestrados para dirigirlo a su médico para cualquier pregunta relacionada a tratamiento, incluidos otros referidos.

†Términos y Condiciones aplican. Este beneficio cubre RINVOQ® (upadacitinib). Elegibilidad: Disponible para pacientes que tienen un seguro comercial con una cubierta de medicamentos recetados para RINVOQ y que cumplen con los criterios de elegibilidad. El programa de asistencia en el copago no está disponible para pacientes que reciben reembolso bajo programas de seguro federales, estatales o financiados por el gobierno (por ejemplo, Medicare [incluida la Parte D], Medicare Advantage, Medigap, Medicaid, TRICARE, programas del Departamento de la Defensa o de Asuntos de los Veteranos) o donde esté prohibido por ley o por el proveedor de seguro médico del paciente. Si en algún momento, un paciente comienza a recibir cobertura para medicamentos recetados bajo algún programa de salud federal, estatal o financiado por el gobierno, el paciente no podrá usar la tarjeta de ahorros de RINVOQ y el paciente tiene que llamar a AbbVie Contigo al 1.855.CONTIGO para suspender su participación. Los pacientes que residen en o reciben tratamiento en ciertos estados puede que no sean elegibles. Los pacientes no pueden solicitar reembolso por el valor recibido por parte del programa AbbVie Contigo de ningún pagador. La oferta está sujeta a cambio o discontinuación sin aviso. Restricciones, incluidos máximos mensuales, pueden aplicar. Esto no es un seguro médico. Para conocer las prácticas de privacidad de AbbVie, así como las opciones de privacidad que usted tiene, visite www.abbvie.com/privacy.html.

Consulte más Información importante de seguridad en las páginas 7 y 8. Consulte la **Información de prescripción** completa, incluida la **Guía del medicamento**, en www.rxabbvie.com/pdf/rinvoq_pi_spa.pdf y consulte con su médico.



Para adultos con espondilitis anquilosante (EA) activa en quienes los bloqueadores del TNF no funcionaron bien.

INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD

USO

RINVOQ es un medicamento recetado usado para tratar a adultos con espondilitis anquilosante activa cuando 1 o más medicamentos, conocidos como bloqueadores del factor de necrosis tumoral (TNF, por sus siglas en inglés), se han usado y no han funcionado bien o no pudieron tolerarse. No se conoce si RINVOQ es seguro y eficaz en niños con espondilitis anquilosante.

¿Cuál es la información más importante que debo saber sobre RINVOQ?

RINVOQ puede causar efectos secundarios graves, tales como:

- **Infecciones graves.** RINVOQ puede reducir su capacidad para combatir infecciones. Durante el tratamiento con RINVOQ se han producido infecciones graves, tales como tuberculosis (TB) e infecciones causadas por bacterias, hongos o virus que pueden diseminarse por todo el cuerpo. Algunas personas murieron debido a estas infecciones. Su proveedor de atención médica deberá hacerle un análisis para determinar si tiene TB antes de que usted comience su tratamiento con RINVOQ, y mantenerle bajo observación estrecha para detectar signos y síntomas de TB en el transcurso del tratamiento con RINVOQ. No deberá comenzar a tomar RINVOQ si tiene algún tipo de infección, a menos que su proveedor de atención médica le diga que puede hacerlo. Si usted contrae una infección grave, su proveedor de atención médica podría suspenderle el tratamiento con RINVOQ hasta que la infección esté bajo control. Quizás corra un mayor riesgo de presentar culebrilla (herpes zóster).
- **Un aumento del riesgo de muerte en personas mayores de 50 años que tengan por lo menos 1 factor de riesgo de cardiopatía (enfermedad cardiovascular).**
- **Cáncer y problemas del sistema inmunitario.** RINVOQ podría aumentar el riesgo de presentar determinados cánceres, tales como linfoma y cánceres de la piel (entre otros). Los fumadores o exfumadores corren un mayor riesgo de presentar determinados tipos de cáncer, tales como linfoma y cáncer de pulmón. Siga las recomendaciones que le dé su proveedor de atención médica en cuanto a hacerse revisar la piel para detectar cáncer de la piel durante su tratamiento con RINVOQ. Limite la cantidad de tiempo que permanezca expuesto a la luz solar. Cuando esté expuesto a la luz solar, póngase indumentaria protectora y aplíquese filtro solar.
- **Un aumento del riesgo de eventos cardiovasculares (CV) graves, tales como infarto de miocardio, accidente cerebrovascular o muerte en personas mayores de 50 años que tengan al menos 1 factor de riesgo de cardiopatía (enfermedad cardiovascular), especialmente en fumadores o exfumadores.**
- **Coágulos sanguíneos.** Con RINVOQ pueden producirse coágulos de sangre en las venas de las piernas o los pulmones y las arterias, los cuales podrían ser potencialmente mortales e incluso causar la muerte. Los coágulos de sangre en las venas de las piernas y los pulmones se han presentado con mayor frecuencia en personas mayores de 50 años que tienen al menos 1 factor de riesgo de cardiopatía (enfermedad cardiovascular).
- **Reacciones alérgicas.** En personas que tomaban RINVOQ se han observado síntomas como ronchas (urticaria); dificultad para respirar; desmayos; mareos, o hinchazón de los labios, la lengua o la garganta, que podrían indicar que se está produciendo una reacción alérgica. Algunas de estas reacciones fueron graves. Si presenta cualquiera de estos síntomas durante el tratamiento con RINVOQ, deje de tomar RINVOQ y busque atención médica de emergencia inmediatamente.
- **Desgarros en el estómago o los intestinos.** Esto ocurre más a menudo en personas que toman antiinflamatorios no esteroideos (AINE) o corticoesteroides. Obtenga atención médica de inmediato si tiene dolor abdominal, fiebre, escalofríos, náuseas o vómitos.
- **Alteraciones de algunos análisis clínicos.** Su proveedor de atención médica deberá hacerle análisis de sangre antes de que usted comience a tomar RINVOQ y durante su tratamiento. Su proveedor de atención médica podría interrumpir su tratamiento con RINVOQ por cierto tiempo, si es necesario a causa de los cambios de los resultados de estos análisis de sangre.

No tome RINVOQ si le tiene alergia al upadacitinib o a cualquiera de los componentes de RINVOQ. Encontrará una lista completa de los componentes en la Guía del medicamento o el Resumen breve para el consumidor.

Consulte la **Información de prescripción** completa, incluida la **Guía del medicamento**, en www.rxabbvie.com/pdf/rinvoq_pi_spa.pdf y consulte con su médico.

¿Qué debo decirle a mi proveedor de atención médica ANTES de comenzar a tomar RINVOQ?

Informe a su proveedor de atención médica si:

- está recibiendo tratamiento por una infección, tiene una infección que no desaparece o que le sigue reapareciendo o tiene síntomas de infección, tales como:
 - Fiebre, sudores o escalofríos
 - Falta de aliento
 - Enrojecimiento, calor o dolor de la piel, o llagas en el cuerpo
 - Dolores musculares
 - Cansancio
 - Sangre en las flemas
 - Diarrea o dolor de estómago
 - Tos
 - Pérdida de peso
 - Ardor al orinar o necesidad de orinar con mayor frecuencia de la normal
- Tiene TB o ha estado en contacto estrecho con una persona que la tenga.
- Es fumador o exfumador.
- Ha tenido un infarto de miocardio, otros problemas cardíacos o un accidente cerebrovascular.
- Ha tenido o tiene cualquier tipo de cáncer, hepatitis B o C, culebrilla (herpes zóster), coágulos de sangre en las venas de las piernas o los pulmones, diverticulitis (inflamación en partes del intestino grueso) o úlceras en el estómago o los intestinos.
- Tiene otras afecciones médicas, tales como problemas del hígado, bajas cifras de glóbulos sanguíneos, diabetes, una enfermedad pulmonar crónica, el VIH o el sistema inmunitario debilitado.
- Vive o ha vivido en (o viajado a) partes de Estados Unidos, como los valles de los ríos Ohio y Mississippi y el Suroeste del país, en que el riesgo de contraer ciertos tipos de infecciones por hongos es mayor. Si no sabe con certeza de si ha estado en estos tipos de regiones, pregúnteselo a su proveedor de atención médica.
- Recibió recientemente una vacuna o tiene programado recibir alguna. Las personas que tomen RINVOQ no deberán recibir vacunas elaboradas con microbios vivos.
- Está embarazada o planea quedar embarazada. Los estudios en animales indican que RINVOQ podría perjudicar al bebé en gestación. Su proveedor de atención médica determinará si usted está embarazada o no antes de que comience a tomar RINVOQ. Use métodos anticonceptivos eficaces para prevenir el embarazo mientras tome RINVOQ y durante 4 semanas después de su última dosis.
- Hay un programa de vigilancia del embarazo para RINVOQ. Este programa tiene la finalidad de recopilar información sobre su salud y la de su bebé. Si usted queda embarazada durante su tratamiento con RINVOQ, se recomienda informe del embarazo llamando al 1-800-633-9110.
- Está amamantando o tiene intenciones de amamantar. RINVOQ podría pasar a la leche materna humana. No amamante durante el tratamiento con RINVOQ ni durante los 6 días posteriores a su última dosis.

Informe a su proveedor de atención médica de todos los medicamentos que use, incluidos los de venta con y sin receta, las vitaminas y los suplementos a base de hierbas. RINVOQ y otros medicamentos pueden reaccionar entre sí y dar lugar a efectos secundarios.

Informe especialmente a su proveedor de atención médica si toma:

- Medicamentos para infecciones por hongos o bacterias
- Rifampicina o fenitoína
- Medicamentos que afectan el sistema inmunitario

Si no sabe con certeza si ha está tomando alguno de estos medicamentos, pregúnteselo a su proveedor de atención médica o farmacéutico.

**CONTINÚA EN LA
PÁGINA SIGUIENTE** >

INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD

(continúa de la página anterior)

¿Qué debería evitar mientras use RINVOQ?

Durante el tratamiento con RINVOQ deberá evitar los alimentos y las bebidas que contengan toronja (pomelo), ya que su consumo podría aumentar el riesgo de que se produzcan efectos secundarios.

¿Qué debo hacer o decirle a mi proveedor de atención médica DESPUÉS de comenzar a tomar RINVOQ?

- Informe inmediatamente a su proveedor de atención médica si tiene algún síntoma de infección. El tratamiento con RINVOQ puede aumentar su propensión a contraer infecciones o empeorar infecciones que ya tenga.
- Busque atención de emergencia inmediatamente si tiene algún síntoma de infarto de miocardio o de accidente cerebrovascular mientras tome RINVOQ, incluidos:
 - Molestias en la zona central del pecho que duren más de unos minutos o que desaparezcan y vuelvan a aparecer
 - Opresión, dolor, tensión o pesadez intensos en el pecho, la garganta, el cuello o la mandíbula
 - Dolor o molestias en los brazos, la espalda, el cuello, la mandíbula o el estómago
 - Falta de aliento, con o sin molestias en el pecho
 - Sudores fríos repentinos
 - Náuseas o vómitos
 - Sensación de mareo
 - Debilidad en una parte o un lado del cuerpo
 - Habla arrastrada
- Informe inmediatamente a su proveedor de atención médica si durante el tratamiento con RINVOQ presenta cualquier signo o síntoma de coágulos de sangre; por ejemplo:
 - Hinchazón
 - Dolor o sensibilidad en una o ambas piernas
 - Dolor repentino y sin explicación en el pecho o la parte superior de la espalda
 - Falta de aliento o dificultad para respirar
- Informe inmediatamente a su proveedor de atención médica si tiene fiebre o dolor abdominal persistente y algún cambio en sus hábitos intestinales.

¿Cuáles son otros efectos secundarios posibles de RINVOQ?

Entre los efectos secundarios frecuentes figuran: infecciones de las vías respiratorias superiores (resfriado común, sinusitis); culebrilla (herpes zóster); infecciones por el virus del herpes simple (incluidos fuegos labiales); bronquitis; náuseas; tos; fiebre; acné; dolor de cabeza; aumento de los niveles sanguíneos de creatina fosfocinasa; reacciones alérgicas; inflamación de los folículos pilosos; dolor abdominal (zona del estómago); aumento de peso; gripe; cansancio; cifras bajas de determinados tipos de glóbulos blancos (neutropenia, linfopenia, leucopenia); dolor muscular; enfermedad seudogripal; sarpullido; aumento de los niveles sanguíneos de colesterol; aumento de los niveles de enzimas hepáticas; neumonía; cifras bajas de glóbulos rojos (anemia), e infección del estómago y el intestino (gastroenteritis).

Ha habido casos de separación o desgarro de la parte posterior del ojo (desprendimiento de retina) en personas con dermatitis atópica tratadas con RINVOQ. Llame de inmediato a su proveedor de atención médica si tiene cambios repentinos de la visión durante el tratamiento con RINVOQ.

Puede que algunas personas que toman RINVOQ vean residuos del medicamento (un comprimido entero o en fragmentos) en las heces; si esto le sucede, llame a su proveedor de atención médica.

Estos no son los únicos efectos secundarios posibles de RINVOQ.

¿Cómo debo usar RINVOQ?

RINVOQ se toma una vez al día con o sin alimentos. No parta, triture ni mastique el comprimido. Tome RINVOQ exactamente según las indicaciones de su proveedor de atención médica. RINVOQ está disponible en comprimidos de liberación prolongada de 15 mg, 30 mg y 45 mg.

Esta es la información más importante que debe conocer sobre RINVOQ. Para obtener más información, consulte con su proveedor de atención médica.

Se le aconseja notificar a la FDA los efectos secundarios negativos de los fármacos con receta. Visite www.fda.gov/medwatch o llame al 1-800-FDA-1088.

Si tiene dificultades para pagar su medicamento, AbbVie podría ayudarle. Visite AbbVie.com/myAbbVieAssist para obtener más información.

Consulte la [Información de prescripción](#) completa, incluida la [Guía del medicamento](#), en www.rxabbvie.com/pdf/rinvoq_pi_spa.pdf y consulte con su médico.



**HAZLO TU
MISIÓN**

abbvie

© 2024 AbbVie. Todos los derechos reservados.
RINVOQ® y su diseño son marcas registradas de AbbVie Biotechnology Ltd.
US-RNQR-240373 Junio de 2024